



主题目标

1. 初步了解自己的喜好，感受自己的成长，并为自己的成长感到高兴。
2. 能在活动中大胆尝试、主动交往，愿意和同伴一起游戏，分享共同活动带来的欢乐。
3. 学习解扣子，练习自己穿脱简单的衣裤鞋袜，掌握初步的生活技能。
4. 学会用完整的短句表达自己的情感，复述简短有趣的故事、儿歌。
5. 通过完成力所能及的事情，感受到自己长大了，体验成长的骄傲。
6. 学习正确洗手、擦鼻子、刷牙的方法，愿意养成良好的生活习惯。
7. 初步学习一些生活自理的方法，尝试进行自我服务。



第 十五 周工作计划

主题：宝宝真能干 小（2）班 日期： 12月4日—12月8日 带班老师：包老师、姚老师

工作要求		1. 了解成长中身体和心理上的变化，体验成长的快乐。 2. 能够按照不同的风格、节奏演唱歌曲，并对歌曲进行表演。 3. 能够运用一定的装饰方法，比如剪、贴、撕等方法进行作品创作和装饰。 4. 能够掌握一定的方法保护自己的身体，并且可以做一些力所能及的事情，在活动中体验劳动的快乐。				
星期	内容	一	二	三	四	五
晨间活动	来园	1. 来园接待：热情接待幼儿来园，与幼儿有礼貌地打招呼。 2. 区域游戏：☆益智区：提供拼图，幼儿根据图示进行颜色匹配。 生活区：提供扣扣子步骤图，自己拉拉链、扣扣子。 科学区：提供物品和影子的图片，幼儿进行配对。 3. 晨间谈话：穿衣口诀、叠衣要点、自己的事情自己做等 4. 其他：引导幼儿来园时自己选择想做的晨间活动。				
	户外锻炼	1. 队列练习：能有序地站到自己的点子，并踏步。 2. 律动、早操：教师带领幼儿一起做律动和早操，动作有精神。 3. 分散活动：幼儿自由选择等器械不争抢玩具，不互相追逐。				
		集体游戏：运小球（合作）	集体游戏：毛虫（合作、蹲走）	集体游戏：赶小猪（追逐跑）	集体游戏：钻山洞（钻爬）	集体游戏：鸭子过桥（平衡）
学习活动		我要自己走（语言）	我会打招呼（社会）	彩色玻璃窗（欣赏）	我会自己擦鼻涕（健康）	给小动物送食物（数学）
上午游戏		饲养区	科发室	二楼建构	山洞拱笼	区域游戏
下午活动		区域游戏	区域游戏	区域游戏	区域游戏	区域游戏
日常生活		1. 引导幼儿根据天气及时增减自己的衣物，避免感冒。 2. 鼓励幼儿自己穿脱衣服，提醒幼儿将脱下来的衣服折叠并摆整齐。 3. 根据图形匹配整理图书，并且会仔细检查。				
家长工作		1. 在家帮助大人做一些力所能及的事情，家长可以教授一些生活技能。 2. 请家长根据孩子体质，合理调整着装，提醒幼儿感到热或冷的时候及时穿脱衣服。 3. 做好出勤记录，询问生病幼儿在家情况。				
环境创设		1. 在生活区增添拉拉链的材料以及扣扣子的材料，幼儿进行游戏。 2. 将幼儿的活动探索过程布置到主题墙。				

表扬栏.

吃饭之星：施易知、张亦然、李成哲



学习之星：李蒋沐阳、汪昊贤、秦悦、李依灿



进步之星：居修乐、罗昱琨、徐佑宁

纪律之星：马新景、梁乐析、周诗浩



教材登选：

附儿歌：

我要自己走

妈妈、妈妈，你快撒手，
我要自己走。
你看小燕子能飞，
小兔儿能跳，
小狗儿能跑，
小鱼儿能游，
我为什么不能自己走？
妈妈、妈妈，你快撒手。

分享 | 冬季常见幼儿传染病

由于冬季气候多变，早晚温差大。感冒、咳嗽的孩子多起来，一些幼儿体质较弱，为了保证孩子的健康。给大家分享介绍几种常见传染病内容!!

流行性感冒：流感由流感病毒引起的急性呼吸道传染病，具有很强的传染性，其发病率占传染病之首位。

临床表现：发热、全身酸痛、咽痛、部分患者有流清涕、鼻塞、眼结膜充血等症状。

预防措施：隔离病人，隔离期为1周。流行期间尽量避免人多场合，室内注意通风。

手足口病：是肠道病毒感染引起的一种儿童常见传染病。

临床表现：先表现为咳嗽、流鼻涕、烦躁、哭闹，多数不发烧或有低烧，发病1~3天后，当红疹转为水疱后会传染给别人。 本病的预防很重要，要养成讲卫生的良好习惯，做到饭前、便后洗手，对餐具、生活用品、玩具等应定期消毒。

腮腺炎：是腮腺炎病毒引起的急性呼吸道传染病，感染后可获得终生免疫。最常见的并发症是无菌性脑膜炎综合征，染上此病后不能到公共场所，以避免传染给别人，要在病愈后一周才可上学。切断传染源是防止继续传染最重要的办法。

红眼病：是由于细菌感染所致的一种常见的急性流行性结膜炎。常在春夏季暴发流行。其特点是发病急、传染性强。临床表现：眼红、畏光、灼热感、眼皮肿痛流泪、分泌物增多，严重者会伴有头痛、发热、耳前淋巴结肿大等症状。

水痘：由空气飞沫经呼吸道传染。临床表现是低热，依次皮肤出现红色丘疹、疱疹、结痂，皮疹周围充血，成对出现，躯干分布较多。 从发现水痘到全部皮疹干燥结痂期间都应该隔离。对密切接触的孩子应该检疫3周。

风疹：由空气飞沫经呼吸道传染。临床表现是发热、咳嗽、流涕，1-2天后全身出现红色斑丘疹，且在一天内出齐，疹退后无脱皮，耳后淋巴结肿大。发疹后5-7天为隔离期。接触患儿的有关人员应严格执行消毒隔离措施，以免间接传播风疹。