



第 十一 周工作计划

班级：中 4 班 实施主题：小小科学家 日期：5 月 11 日—5 月 15 日 带班老师：田、蒋老师

工作要求	1. 知道物体的形状有圆的，也有方的，它们各有各的功能。（主题目标） 2. 会用抛接、身体碰、头顶等方式玩球。（主题目标） 3. 引导幼儿知道出汗了可以适当脱去一件衣服，或者休息一会儿。（保育目标） 4. 户外活动时，鼓励幼儿自由结伴，玩合作性的游戏，并注意安全。（常规目标）				
星期内容	一	二	三	四	五
接待	1. 热情接待幼儿，进行自主签到，引导幼儿进行同伴间互动。 2. 进行二次晨检，了解幼儿身体情况及检查幼儿口袋是否有小玩具等物品。				
晨间游戏	1. 签到 ：热情接待幼儿来园，引导幼儿签到后洗手吃点心。 2. 重点区域 ：美工区：轮子滚滚乐，提供不同大小、不同花纹的轮子，在指定的区域进行创意画。 建构区：提供各种桌面拼插材料，引导也偶然尝试在桌面建构拼搭汽车。图书区：提供《小猴套圈》的头饰，引导幼儿演一演故事。 3. 晨间谈话 ：我认识的图形、圆圆和方方、不同形状的本领等。				
	晨间活动	1. 队列练习：能在老师的点名、引导下，按照序号排成两条队伍。 2. 律动、早操：乐意跟随音乐，模仿老师的动作，进行韵律活动。			
户外锻炼	集体游戏：摘果果 (平衡区) 多种方式走平衡	阳光大运动	集体游戏：翻山越岭 (探险 1 区) 攀爬、翻越	阳光大运动	集体游戏：力量拉力 (综合 1 区) 滚轮胎
	分散活动：重点指导 走不同高度平衡木		分散活动：重点指导 幼儿翻越障碍		分散活动：重点指导 幼儿探索轮胎玩法
学习活动	语言：圆圆和方方 知道各有长处	社会：交通标志大集合 认识不同的标志	健康：我和球儿一起玩 自由探索球的玩法	数学：图形变变变 在拼搭中感受图形变化	科学：骨碌碌，滚呀滚 了解轮胎外形特征
上午户外活动	过家家	图书室	创意社	游戏活动	科发室
下午游戏	游戏活动	游戏活动	游戏活动	快乐骑行	游戏活动
日常生活	1. 过渡环节，组织幼儿听音乐和同伴玩“同伴变变变”的图形游戏。 2. 日常生活中鼓励幼儿寻找身边的圆形，并用流畅的语言说一说自己的发现。				
家长工作	1. 请家长经常鼓励孩子利用一些小工具、小窍门解决所遇到的困难。 2. 鼓励家长引导孩子发现生活中的科学现象，鼓励孩子提问，并耐心解答。				
环境创设	在活动区中增添形态各异、功能多样的轮子，帮助幼儿感知轮子的结构。				
本周反思					



表扬栏

表扬本周积极参与照顾小番茄的小朋友

刘研李 刘柏睿 王知与 赵珂安 杨瑾承

沈洛亦 顾庭谷 陈闾屹 胡锦一 刘舒阳

吴姜 赵珈伊 刘云舒 吴沐阳 张沐宸 胡可芯

朱梓萌 陈奕孜 明硕锦 赵知雨 汪诺一 陆伊橙 陆伊柠



温馨提示

如何预防手足口病

夏季正是感染性腹泻、腮腺炎和手足口病的高发期，以散居儿童和幼儿园的集体场所发病率最高，专家说手足口病口服药物无法起到预防的作用，最好的预防方法就是注意卫生，增强免疫力。如果孩子发热，要随时观察孩子是不是有咽喉肿痛，嘴痛，不想吃饭的现象，同时要非常密切地观察孩子手心和足心有没有长一些红色的小水疱，这些都是手足口病的症状。

一、什么是手足口病？

资料显示，手足口病是一种由肠道病毒引起的传染病，它的主要攻击对象是5岁以下的幼儿，尤其是2岁以下的婴幼儿。患上手足口病的患儿发病前1-2天或发病的同时有程度不同的发热，持续2-3天。患儿发病后，有嘴痛、厌食、咽喉痛、流口水的症状。手足口病的典型症状是手心、足心、口腔黏膜出现米粒大小的小水疱、小疙瘩，一般为淡红色、红色，小水疱里疱液很少，疱壁周围有一红晕。口腔黏膜出现的疱疹疼痛明显，造成孩子进食困难，流涎不止。很多患儿同时在双侧膝盖、臀部出现淡红色、红色的小疙瘩。手足口病发病后，各部位的水疱很快出现结痂，大部分患儿皮疹经过一周左右自然消退，不留瘢痕。有一部分患儿发病初期还会出现低热、咳嗽、流涕等轻度上感症状。一旦发现这些症状，就不要拖延，马上去医院诊治，家长们千万不要随便买一些退烧药和涂抹的东西给孩子使用。

二、手足口病主要传播途径

1. 饮食传播

手足口病的致病原因是肠道内的病毒，所以饮食传播是主要的扩散方式之一。被污染的水、不卫生变质过期的食物都有可能将细菌不断扩散，引起孩子感染。

2. 飞沫传播

患儿的飞沫中可能带有病毒和咽喉的一些分泌物，几个孩子一起说话时，病毒可能在不知不觉间就传播开了。

3. 接触传播

患儿玩过的玩具、用过的餐具、毛巾、被子、内衣等等都有可能沾染上细菌，健



康的孩子接触这些东西可能会让细菌有机可乘，还有孩子过去密集的地方病毒传播得比较快，比如说幼儿园、培训班等等。

三、如何预防手足口病？

家长一定在饭前便后、外出回家后用洗手液等给孩子洗手。这段非常时期不要带孩子到人群聚集、空气流通差的公共场所，减少被感染的机会。同时要注意保持家庭环境卫生，家里面可以经常熏一下白醋，晨起要通风，孩子的衣服每天都要换洗，棉被要经常在阳光下晾晒。另外孩子尽量不要喝生水、吃生冷食物；避免接触患病儿童。

这段时间要求孩子养成规律的作息时时间，不要过度疲劳，降低了身体的抵抗力。